四庫全書

子部

普濟方卷三十七

明　周王朱橚　撰

大腸腑門

總論

夫大腸腑者主肺也鼻主中央是其候也肺絡氣於大腸大腸者為行道傳瀉之府也號監倉椽重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脈和利精神千金明堂外臺同難

經云長二丈一尺大四寸徑一尺之少半十六曲盛穀一斗七升半

鼻遂以長以後大腸右手關前寸口陽絶者無大腸脈也若少氣心下有水氣立秋節即咳刺手太陰治陰在魚際間○右手關前寸口陽實者大腸實也若陽中切痛如刺刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之○大腸鳴者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒則泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉○腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里○大腸脹

者腸鳴而痛寒則溏食不化大腸有寒鶩溏有熱便腸

垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀○肺前受病移

於大腸肺咳不已咳則遺失便利厥氣客於大腸則夢

田野肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏

大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直

皮肉不相離者大腸結○扁鵲云手太陰與陽明為表

裏大腸若病實則傷熱熱則腸滿不通口為生瘡食下

入腸腸實而胃虛食下胃胃實而腸虛所以實而不滿

乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴溏青白之痢而發於氣水根在大腸○大腸絶不治何以知之溏利無度利絶則死○病者乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣名曰氣狸以秋三月源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若腑虛為陰邪所傷則乍寒乍熱臟實為陽毒所傷則體熱發斑

大腸實論

夫右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸

滿善喘咳面赤身熱喉咽中核狀名曰大腸實熱也大腸者傳瀉行導之府也其氣盛實燥熱生焉傳瀉不利腸中痛如錐刺或生鼠乳腫脹痛悶大便不通腹脇脹滿腰背重痛上氣喘滿皆大腸氣實之證也夫大腸實則生熱熱則腸結脹滿喜氣喘欬身面熱喉中噎乍實乍虛乍來乍去大腸有宿滯則發寒慄如瘧狀便秘不通則是大腸實熱之候也

茯苓麻黄湯出聖濟總錄 治大腸實熱令人氣脹滿

白茯苓去黑皮 麻黄去根節各一兩半 黄耆剉 大青剉 桂去麤皮各三分 細辛去苗葉 杏仁湯浸去皮尖炒各一兩一分 石膏三兩碎 丹參半兩 五味子 陳橘皮去白焙 甘草炙剉 貝母 芎藭各一兩 枳殻麩炒三枚

右㕮咀帛裹三錢井華水盞半煎八分去滓温服

羚羊角散出聖惠方 治大腸實熱心神煩躁口内生瘡

羚羊角屑三分 甘竹茹 川朴硝 川大黄剉炒各一兩 黄芩 梔子仁 紫蘇莖葉 杏仁湯浸去皮雙仁炒

玄參　木通　赤茯苓各三分　甘草半兩炙剉

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓入地黄汁一合更煎一兩沸不計時温服

生薑泄腸湯出千金方　治大腸實熱腹脹不通口為生瘡

生薑　橘皮　青竹茹　黄芩　梔子仁　白朮各三分　桂心一兩　茯苓　芒硝各三兩　生地黄十兩　大棗四枚

右㕮咀水七升煮取三升去滓下芒硝分二服一方無桂心名瀉白湯

檳榔丸出聖惠方 治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便

秘實

檳榔 大黃蒸 麻子仁炒去殼別研 枳殼麩炒 羌活去蘆 牽

牛炒 杏仁去皮尖炒 白芷 黄芩各一兩 人參半兩

右㕮咀為末煉蜜丸梧桐子大每服四十丸空心用

熟水送下以大腑流利為度

杏仁丸出聖惠方 治大腸實熱大便不通上氣喘咳心神煩

悶

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 甘草炒剉各一兩 赤芍藥 黄芩 麥門冬去心焙 細辛去苗葉 五味子各三分 石膏碎二兩 大黄剉炒一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

大黄丸出楊子建護命方 治大腸秘熱心胸煩燥頭痛便秘腹脇脹滿口舌乾燥

大黄炮剉半兩 桔梗炒 枳殻麩炒去瓤 芎藭 羌活去蘆 木香 柴胡去苗 獨活去蘆頭各一分 牽牛一兩半炒熟半生用

右為末熟煎萊菔入藥同於木臼內搗令丸得為度丸如梧子大每服三十丸食後臨卧熱湯下加至四十丸

赤茯苓散出聖惠方 治大腸實熱頭痛目眩驚狂喉痺腹脹滿悶手足煩痛

赤茯苓 麥門冬去心 檳榔各一兩 川大黄一兩半 犀角屑 枳實麩炒各三分 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 丹參各半兩 石膏二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服忌熱麵炙煿

柴胡散出聖惠方 治大便實熱氣壅不通心腹脹滿發渴寒熱

柴胡去苗 赤芍藥 檳榔各一兩 枳實麩炒 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 黄芩 漢防已各三分 川大黄三兩剉炙 甘草半兩炙炒

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

大青湯出聖濟總録 治大腸熱滿腸中切痛或生䑕乳大

便不通

大青剉三分　麻黄去根節　石膏碎　芒硝碎　黄柏去麤皮　生地黄焙各一兩半　枳殻麩炒去瓤　赤茯苓去黑皮

右㕮咀每服三錢水一盞半入苦竹葉十片煎八分去滓温服日三

橘皮湯出聖濟總錄　治大腸熱欬脇滿掌中熱

陳橘皮　芒硝　紫蘇葉各一兩半　白术一兩　甘草炙剉　桂去麤皮各半兩　石膏瑩淨者三兩碎　杏仁炒一分去皮

右㕮咀每服三錢水一盞半淡竹葉十片葱白四寸劈破煎八分去滓温三日

治白氣狸肺腑温病陰陽毒臓實為陽毒所傷熱肌膚發斑氣喘引色昏白者

紫菀茸一兩 梔子仁 升麻 前胡各三分 葶藶炒一分

杏仁去皮尖炒 甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

大腹皮散出聖惠方 治大腸實熱腸脹不通熱氣上衝

口内生瘡

大腹皮三兩剉 柴胡去苗 訶梨勒皮 枳殻麩炒去瓤各一兩

川大黄剉炒 川朴硝各二兩 羚羊角屑三分 甘草半兩炙

右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

大腹湯出聖濟總録 治大腸實熱腹脹不通上衝口内生

瘡

大腹皮 大黄生剉各二兩 木香一兩 訶梨勒皮三分 枳殻去瓤炒一兩 芎藭三分

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓温服

神功丸出聖濟總録 治氣壅大腸風熱大便不通方見本門大便秘澀不通類四味神功丸

治腸痛如打

用豆半升炒令焦酒一升煮令沸熟取醉

瀉白湯出鮑氏方 治大腸實熱腹脹不通夾臍痛喘不能

久立口瘡

陳皮 淡竹葉 黄芩 梔子仁 黄栢皮一兩半

茯苓　芒硝一兩　生地黄五兩

右為散每服四錢薑棗煎空心服

大腸虚論

夫右手寸口氣口以前脉陽虚者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虚渴唇乾目急善驚洩白名曰大腸虚冷也其候胸中喘腸鳴虚渴唇乾皮膚乾燥目急善驚滑洩骨節疼痛不能久立葢大腸者傳導之官變化出焉寒邪客於其間則冷氣虚弱不能自固而成諸疾診其脉

右手氣口以前陽虚者是也

款冬花丸　療大腸虚冷欠呿欬氣短少腹中痛

款冬花（七分）　桂心　五味子（各六分）　乾薑　芎藭　甘草（炙各五分）　附子（炮四分）　桔梗（四分）　蘇子（五合）　蜀椒（一升）　百部汁（七合）　白蜜（一升）　乾棗（五十枚劈去皮研為脂）　薑汁

右為末將薑汁和蜜微火煎丸如梧子大每服温酒下三十丸加至四十丸日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱

草荳蔻散出聖惠方　治大腸虛冷腸鳴腹痛下痢不思飲食

草荳蔻去皮　陳橘皮湯浸去白瓤焙各一兩　高良薑剉三分　桂心

丁香　木香　白朮　當歸剉炒　白荳蔻去皮　肉荳蔻去殼各半兩　甘草一分炙剉

右為末每服半錢食前以薑棗湯調下

木香丸出聖惠方　治大腸虛冷切痛腸鳴食不消化

木香　白朮　桂心　蕪荑炒　高良薑剉各一兩　訶梨

勒[煨去皮一兩半]肉荳蔻[去殻三分炮]乾薑[炮]附子[二兩炮裂去皮臍]厚朴[二兩去麄皮薑汁塗炒]甘草[炙半兩]

右為末用神麯末煮作糊丸梧桐子大食前薑棗湯下十九

治白氣狸肺腑臟温病陰陽毒大腸腑虚為陰邪所傷寒熱互作上氣欬逆大腸飧洩色皓皓白者

白朮　人參[各一兩]　乾薑[炮]　麥蘖[炒各三分]　白茯苓　五味子　肉豆蔻　草菓　烏梅　甘草[炙各半兩]

右㕮咀每服五錢水盞半煎七分去滓食前服

吳茱萸散出聖惠方　治大腸虛冷腸鳴腹痛食不消化

吳茱萸湯浸七次焙乾炒　肉豆蔻去殼　乾薑炮　甘草炙各半兩剉

陳橘皮二兩泡去白焙　高良薑剉　縮砂去皮　神麴搗碎炒　白朮各一兩　厚朴二兩去麤皮薑汁炒

右為末每服一錢食前粥飲調下

訶梨勒散出聖惠方　治大腸虛冷腸鳴泄痢腹脇氣痛飲食不化

訶梨勒一兩半煨用皮 附子炮去皮臍 陳橘皮湯浸去白各一兩焙 當歸剉炒 肉豆蔻去殼各三分 桔梗去蘆 木香各半兩 吳茱萸湯浸七次焙炒 甘草炙剉各一分

右㕮咀每服三錢水一鍾入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服

防風丸出聖濟總錄 治大腸氣虛又因傷風冒雨大腸中下血

防風去仁 芎藭各一分 黃耆剉 朮各半兩 五味子 續斷

陳橘皮湯浸去白各一分　石硫黄研一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心鹽米湯下三十丸

訶梨勒丸出醫方集成　治大腸虚冷腸鳴洩瀉腹脇氣痛飲食不化

訶梨勒麵裹煨　附子炮去皮臍　肉豆蔻麵裹煨　木香不見火　呉茱萸去梗炒　龍骨生用　白茯苓去皮　蓽撥各半兩

右為末薑汁煮糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲下

黄連補湯出千金方　治大腸虚冷痢下青白腸中雷鳴相逐

黄連四兩　茯苓　芎藭各三兩　酸石榴皮　地榆五兩　伏龍肝雞子大一枚

右㕮咀水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分三服

附子湯出聖惠方　治大腸虚冷腰痛羸瘦

附子炮去皮臍一兩半　人參　乾薑炮　赤芍藥　桂去粗皮

甘草炙各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞棗三枚煎六分去滓食溫服

茱萸丸出聖濟總錄 治大腸虛冷飲食減少非飧洩

吳茱萸湯浸晒乾焙 訶梨勒皮 丁香 草豆蔻去皮 芎藭 防風去叉各一分 石硫黃研一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心陳米飲下

黃連湯出聖濟總錄 治大腸虛冷痢下白膿腸內虛鳴相

逐

黄連去鬚 酸石榴皮焙 赤石脂各三兩 白茯苓去黑皮 乾薑炮各二兩半 桔梗炒二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服日三服

芘葫丸出聖濟總錄 治大腸虚腸痛不能久立或腰中虚鳴

芘葫去苗土 枳殻炒去瓤各一兩半 白朮三錢 白茯苓去黑皮一兩

丹參去根炙 黄耆剉各二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空腹粥飲下三十丸日三服

朴附丸出聖濟總錄 治大腸虚冷便痢滑洩不思飲食腸鳴腹痛

厚朴去粗皮生薑汁炙一兩 附子炮去皮臍半兩 甘草炙一兩 乾薑炮一兩

右為末酒煮麵糊為丸梧桐子大每服五十丸食前

温米飲下

大建中湯出聖濟總録　治大腸虚

乾薑炮一兩半　芍藥　甘草炙剉　桂去粗皮各一兩

右㕮咀每服二錢棗三枚去核餳一塊水一盞煎七分去滓空腹温服日三服

乳豆丸出濟生方　治大腸虚寒滑泄不止

鍾乳粉一兩　肉豆蔲半兩麪裹煨香去麪不用

右為末煮棗肉杵為丸梧桐子大每服七十丸空

心食前米飲送下

治大腸虛冷

用鰻鯉魚煮酒服益其魚能補虛

固腸湯 出鮑氏方 治大腸虛寒痢下青白腸中雷鳴大便秘小便赤上氣充胸難久立身腫腹急當臍痛

酸石榴皮 半兩 黄連 炒 地榆皮 一兩

右為散每服四錢薑五片烏梅一個煎空心服

腸風下血 附論

夫腸風臟毒下血者皆因飽食過度房室勞損坐卧當風恣餐生冷或啖炙煿或飲酒過度榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑熱因乘之使血性流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血血清而色鮮者腸風也濁而色黯者腸毒也肛門射如血線者蟲蛀也又有陽氣不升血隨氣降而下血者下虛也下虛之脈脈多洪大而芤葢弦者勞也芤者下血也治療之法風則散之熱則清之寒則溫之虛則補之治法合無不效者矣○大便下血或

清或濁或鮮或黑或在便後或與泄物並下此由內外有所傷感凝停在腸胃清氣不通亦妄行之類故曰便血方書以鮮血為腸風瘀血為熱毒濺注為腸痔受病之初或因大腸有熱毒血朝於下或因下虛而腸臟無脂膜血得以滲入及其久則成痼疾矣亦時有所感觸而發之如遇熱發則為瘀血遇寒發則為清鮮遇濕發則為豆汁血色亦因而轉不可拘以一說〇人之滋養一身惟氣與血血為榮氣為衛榮行於脈中衛行於脈

外故心主血肝藏之而脾為之統貴於氣順則血調若內因七情并酒食所傷外為四氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人下血若風入腸胃者其脈浮下血必在糞前是名近血停積於大腸者其脈沈滯血在糞後是名遠血臟寒者其脈沈微下血無痛積熱者其脈洪數純下鮮血甚則鮮血多而不止廉痛傷濕者脈沈而遲下血如豆汁令人面無顏色時寒時熱脈浮弱按之絶者下血也○治法大要先當解散腸胃風邪熱者與

敗毒散冷者與不換金正氣散風邪既去然後隨其冷熱而對治之或便血遇熱則行止血氣用凉藥如地榆散蘗皮湯黃連阿膠丸酒蒸黃連丸輩施之熱症固當然爾其或陽虛陰走正氣不得歸元則用木香理中湯附子理中湯震靈丹黑錫丹輩治之皆不可偏廢要之芎藭湯一劑又調血之上品熱者加茯苓槐花冷者加茯苓木香此則自根自本之論也雖然精氣血氣生於穀氣故凡大腸下血大抵以胃藥收功真料四君子湯參

苓白术散以枳殼散小烏沉湯和之胃氣一回血自循於經絡矣然腸風之血自腸中來虫痔之血肛門傍邊別有小竅射如血線是也肛門既脫腐血浸淫於其間則俱化為虫蠹蝕腸口滴血淋漓自比又不能約而收之矣當以蕪荑艾葉苦楝根輩止血亦不用甘草但增棗入藥用○儒門事親書云棠谿欒彥剛病下血醫以藥下之默默而死其子企見戴人過而問之曰吾父之死竟無人知是何症戴人過曰病挫其心也心主行血

故被挫則血不禁若血温身熱者死其死必七日治法不當下抑下之不滿數企曰四日死何為病挫心戴人過曰智不足而强謀内不足而强舉心安得不挫也欒初與鄰爭屋不勝遂得此病企由是服拜而學醫（）又論曰凡人有臟毒下血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝因而大飽筋脈横解腸澼為痔故膿血者血隨熱行參差入于腸胃之間乃成瀉血也若身體壯熱則為難治身涼者可治也可先調中消血湯除積血瀉之二三

行瀉後服芍藥蘗皮丸黄連解毒湯五苓散益元散各以新汲水調下五七錢甚者取地黄汁半盞服之則愈矣○積年腸風下血不止者由人氣血衰弱臟腑僭惑或飲食勞損或毒氣風邪蘊蓄在臟腑流注於大腸既虚下血致面色萎黄四肢消瘦或累月連年諸醫不差故曰積年腸風下血○内經謂結陰者便血一升再結二升三結三升邪在五臟則陰脈不和不和則血流結陰之病以陰氣内結不得外行血無所禀滲入腸間故便血也

方

黄耆湯　治腸風下血

黄耆三兩　槐實　小蘇　桑耳　乾地黄焙　當歸炙剉

黄連去鬚　白芷各一兩　草豆蔻二枚去皮　芎藭　赤石脂

天雄炮去皮臍　龍骨各二兩　黄芩去黑心半兩　紅藍花　訶梨

勒皮　延胡索　厚朴去粗皮薑汁炙　桂去粗皮各一兩

右㕮咀每服五錢水盞半薑一分煎八分去滓食前

温服日二

乾地黄湯　治大便下血并多年腸風飲食不得

熟乾地黄焙　赤石脂各二兩　延胡索　牡蒙　桔梗

黄芩去黑心各半兩　龍骨各一兩半　當歸切焙　黄連去鬚　白芷

地榆　木香　紅藍花炒各一兩　桂去皮三分　乾薑炮　黄耆剉

右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服無時

五香聖散出聖惠方　治腸風氣流注下部致生腫結牽引

腑臟不和時發疼痛經久下血太多虛乏羸瘦

沉香　黄耆剉　枳殻麩炒去穰　熟乾地黄各一兩　麝香半兩

乳香一分　木香　藿香剉炒　檳榔　當歸剉炒　白茯苓

白蒺藜炒　川大黃剉炒　白芍　卷柏炒　芎藭各三兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

内補散出聖惠方　治腸風痔疾失血過多虛乏羸困

續斷　熟乾地黃各二兩　人參去蘆　附子去皮臍炮　當歸剉炒

芎藭　黃耆剉　白芍藥　桂心　麥門冬去心　白茯

苓　乾薑炮剉　五味子各一兩　白芷　甘草炙剉各三分

右㕮咀每服四錢水一盞棗三枚煎六分去滓溫服

日三四服

白花蛇丸出聖惠方 治腸風下血日夜不絶疼痛至甚

白花蛇二兩酒浸去皮骨炙黄 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁炒 黄耆剉 胡荽子炒 蝟皮炙焦 人參去蘆 鯉魚皮燒灰 附子炮去皮臍 當歸剉炒 皂莢樹耳炙各一兩 枳殼麸炒去瓤 男女髮燒灰 肉桂去皺皮各二兩

右為末煉蜜杵丸梧子大每服三十丸食前人參湯下

升陽去熱和血湯出醫方大成 治腸澼下血作便其血即出

有力而遠射四散如春節二月中天氣腹大作痛乃

陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈是其治也又名除濕熱和血湯

生地黄 牡丹皮 生甘草各半錢 熟甘草 黄耆各一錢 當歸身 熟乾地黄 蒼术 秦艽 肉桂各三分 橘皮二分 升麻七分 白芍藥一錢半

右㕮咀作一服水四盞煎一盞去滓稍熱空心服之

白术散出聖惠方 治腸風痔疾失血虛損羸瘦飲食無味面色萎黄四肢乏力

白朮 石斛去根剉 續斷 天門冬去心各三分 黄耆

熟地黄 人參去蘆 肉從容酒浸一宿去皺炙 牛膝 白茯

苓各一兩 桂心 甘草去蘆炙剉各半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不計時温服

内補黄耆湯出聖惠方 治腸風痔病下血太多虚羸無力

黄耆剉 槐子仁炒 枳殻麩炒去穰各三兩 白蒺藜炒去刺 烏

蛇肉酒浸炙 鹿茸去毛塗酥炙 附子炮去皮臍 蝟皮炙 當歸剉炒

沈香　檳榔　厚朴去粗皮薑汁炙各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前桑枝湯下

黄耆丸出簡易方　治久年腸風痔漏方見痔漏門痔漏類

熟乾地黄丸出聖惠方　治内傷風冷大便下血不止

熟乾地黄　龍骨燒赤　黄耆剉　紫蘇子　蒲黄

當歸　附子泡去皮臍　艾葉炒　白礬燒令汁盡　阿膠碎炒各一兩

枳殻半兩麩炒去穰

右末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心及晚食前粥飲下

腸風黑散出直指方 治腸風下血腹痛

枳殼製各一分 甘草炒 烏梅肉炒各半兩 敗棕 頭髮 木饅頭 木賊各燒存性 槐角炒

右為末每服二錢陳米飲乘熱調下

槐皮膏 止痛痒血出

槐皮三兩 薰陸 辛荑 甘草 白芷各半兩 巴豆七枚

乾漆十四枚　桃仁十枚

右以猪脂半斤煎之三上三下去滓以綿裹膏塞下部日四五止痒痛

内補散出聖惠方　治腸風下血不止黄瘦虚羸

蒲黄　白石脂　熟乾地黄各二兩　當歸　白芷

甘草炙剉　黄連去鬚　芎藭各一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾煎六分去滓温服日三四服

內補黃耆散出聖惠方 治腸風下血不止面色萎黃氣力全少

黃耆 龍骨 槐子泡 白芍藥各二兩 當歸剉炒 芎藭 甘草炙剉 附子泡去皮臍各一兩

右㕮咀每服四錢水一鍾煎六分去滓食前溫服

側栢葉散出聖惠方 治大腸風虛積冷下血不止

側栢葉炙 椶櫚皮燒灰 附子泡去皮臍各一兩 防風去蘆 槐花炒 羌活 當歸剉炒各半兩 白朮三分

右為末每服二錢食前粥飲調下

鹿茸丸一名斷紅丸出聖惠方　治臟腑久虚腸風痔漏下血多

面色萎黄日漸羸瘦

鹿茸去毛塗醋炙　附子炮去皮臍　續斷　側柏葉　黄耆剉

厚朴去粗皮塗薑汁炙　阿膠碎炒　當歸剉炒各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲

下一方用白礬無厚朴

黄連貫仲散出神效方儒門事親　治腸風下血

黄連　雞冠花　貫仲　大黄　烏梅各一兩　甘草炙三錢　枳殼泡　荆芥各一兩

右為末每服三錢食前溫米飲調服

槐角散出醫方大成　治腸胃不調脹下滿下血

蒼朮　厚朴　陳皮　當歸　枳殼各一兩　烏梅半兩

槐角二兩　甘草半兩

右㕮咀每服五錢水一鍾煎服

當歸和血湯一名槐花散出醫方大成　治腸澼下血濕毒下血

槐花　青皮各六分　當歸身　升麻各二錢　荊芥六分　川芎四分　熟地黃　白朮各六分

右為末每服二三錢清米飲調下食前忌酒濕麵生冷物

加減四物湯出危氏方　治腸風下血不止

側柏葉　生地黃洗　當歸去蘆酒浸　川芎各一兩　枳殼去穰　荊芥穗　槐花炒　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片烏梅少許煎七

分去滓食前温服一方加防風烏梅各半兩

烏雞丸出經驗良方　治丈夫腸風婦人崩病

麞烏火烟煤是也濃醋和作餅煅又名烏龍尾　蒲黄　乾地黄　芍藥

當歸各五錢　甘草　川烏泡　肉桂各三錢半

右為末蜜丸梧桐子大每服三十丸炒黑豆淋酒服

黄耆散出聖惠方　治腸風痔疾失血後虚損皮膚乾燥四

支黄瘦心神虚煩少得眠卧不能飲食

黄耆剉　熟乾地黄　人參去蘆　柴胡去苗　白茯苓各一兩

棗仁炒 麥門冬去心 枸杞子各三分 防風去蘆 白术 甘草炙剉各半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時温服

卷柏散出聖惠方 治腸風腹痛下血不止

卷柏 熟乾地黄 黄耆各一兩剉 白术 芍藥 甘草炙剉 芎藭各三分 枳殼麩炒去穰 當歸三分剉炒 乾薑半兩泡剉

右㕮咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓溫服日三四服

烏玉丹方見痔漏門痔漏類 治腸風痔漏著床頭痛不可忍

神丹 治腸風痔漏方見痔瘻門痔瘻類

蝟皮丸出聖惠方 治大腸毒下血疼痛

蝟皮炙 莒實 枳實麩炒 黃耆剉 桑木耳炙 地榆

當歸剉炒 烏賊魚骨各一兩 槐子炒二兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲下

黃耆丸出聖惠方 治腸風積年久不瘥轉加羸困

黄耆剉 白礬燒灰各三兩 附子炮去皮臍 硫黄研細水飛 蝟皮炙黄焦 虎眼皮炙黄熟 栝蔞各一兩 榼藤子去殻酥蜜塗炙黄二枚 皂莢去黑皮塗酥蒸一次二枚

右擣羅為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧子大每服三十丸食前粥飲調下

腸風黑散出危氏方　治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之内或食生冷或喫炙煿或飲酒過度積熱腸間致使腸虛弱糟粕不聚大便解血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便頻併皆療之

荆芥（燒二兩） 枳殼（去穰二兩燒一兩） 亂髮（燒） 槐花（燒） 槐角（燒）

甘草（炙） 蝟皮（各一兩半）

右將合燒藥同入甋瓶內黃泥固濟燒存三分性出火氣同甘草枳殼為末每服二錢水一盞煎七分空心溫服溫酒調下亦可

結陰丹（出御藥院方） 治腸風下血及臟毒下血諸大便下血疾

枳殼（麩炒去穰） 威靈仙 黃耆 椿根白皮 陳皮（去白） 何

首烏　荆芥各等分

右為末酒麪糊內少許蜜同丸梧桐子大每服五十丸至七十丸食前米飲下一方不用蜜以醋少許陳米飲煎湯下

治腸風臟毒解酒毒

黄連一兩　防風　槐角　荆芥　烏梅　扁栢葉焦炒黑為度　枳殻各五錢

右為末老米麴醋糊丸每服三五十丸空心米湯下

玉屑丸出本事方　治腸風瀉血不止

槐根白皮去粗皮　苦楝根去皮各三兩　椿根白皮四兩三味於九月後二月前取軟者日乾一方用樗根皮　天南星去膜生薑製　半夏各半兩生薑製

蔵靈仙一兩　寒食麪三兩

右為末滴水丸梧桐子大乾之每服三十丸水八分一盞煎沸下丸子煮令浮以匙抄取温送下不嚼空心食前服頃年有一人下血盈盆頓爾瘦服諸藥皆不効予曰此症腸風冷服玉屑丸三服止余苦疾病三

十年蓄下血藥方近五十品其間或驗或否或始驗而久不應者或初不驗棄之再服有驗未易立談大抵此疾品類不同對病則易愈如下清血絶鮮者腸風也血濁而色黯者臓毒也肛門射如血線者蟲痔也亦有一種下部氣虛陽氣不升血隨氣而降者仲景云脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則忘血精此下部虛而下血者也若傳革脉却止服

温補藥蟲痔宜薰千金方用蝟皮艾者佳予嘗服頗得効

槐角散 出直指方 治腸風下血脫肛

槐角一兩 防風 地榆 當歸 枳殼製 木賊 茯神各半兩

右為末酒麵糊丸梧桐子大每服三十丸米飲下

七妙散 治腸風

枳殼生去穣 椿木皮 雷丸 天麻 白芨 豬牙皂

角各半兩　赤石脂

右為末每服一錢温酒調下空心臨卧服

六君子湯出德生堂方　治便血不止脾胃虛寒飲食不進身體羸弱

人參　白术　白茯苓　當歸　黄耆　白扁豆

甘草各一兩半

右為末每服二三錢米飲調日進三服

蝟皮散出聖惠方　治腸風下血久不瘥面色萎黄

蝟皮灰 蒜莖灰 乾薑炮剉各三兩 牡礪 黄牛角䚡燒灰

枳殻麩炒去穰 酸石榴皮炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

地榆散出聖惠方 治大腸下血久不止

地榆 赤芍藥 生乾地黄 茜根剉 龍骨 黄芩 鷄蘇苗各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

治腸風臓毒下血出本事方

川當歸　枳殼　側栢葉　陳槐子　芍藥　百草霜各等分

右剉同一處炒令烟微起末之每服二錢空心温酒調下日午米湯調下

地榆散出直指方　治腸風熱證下血

地榆　黄連　茜根　黄芩　茯神各半兩　梔子仁一錢

右㕮咀每服三錢薤白寸許煎服又方栢皮湯下

木賊散出直指方　治腸風下血

木賊去節一兩炒　木饅頭炒　枳殼製　槐角炒　茯苓　荆芥各半兩

右為末每服二錢濃煎棗湯調下

腸風方出直指方

香附一兩製　枳殼三分　當歸　川芎各半兩　槐花　甘草炙各一兩

右㕮咀每服五錢新汲水一盞半薑棗煎食前服

防風散出危氏方　治因食熱過度風氣蓄盛銷大腸膏脂以致榮衛之血滲流而下

羌活　荆芥　防風　枳殻　殭蠶去嘴炒　薄荷各等分

右㕮咀白水煎空心温服忌再喫熱物

涼血地黄湯出濟生拔粹方　治如飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下為飱洩久為腸澼夫腸澼者水穀與血另作一泒瀉出也

若時值長夏濕熱大盛正當客氣勝而土弱也故腸

澼之病甚矣

熟地黄　青皮不去穣　槐子炒　當歸各半錢　知母剉炒　黄柏去皮剉烙各一錢

右㕮咀作一服水一盞煎七分去滓温服如小便澀

臍下悶或大便後重則加木香檳榔末各半錢稍熱

服空心或食前如裏急後重又不去者當下之如有

傳變隨症加減

槐荆丸 方見痔漏門痔漏類 治腸風下血先糞後紅

黄連散 出醫方大成 治腸風下血疼痛不止

黄連去須炒 雞冠花焙 貫仲 川大黄 烏梅各一兩 甘草三分炙

右為細末每服二錢温米飲調下日三服不計時

一方無川大黄

玉壺丸 治腸風病年深不効

青嫩角鐵 採半斤劈破用河水五升浸二七日入砂器中煮去四升存一升入藕汁半斤

蜜一兩用火熬成膏稀稠得所去火放冷 枳殼一兩針劄放灯火上燒存性入酒中浸透 胡桃十個依前法 没藥二錢研 陰地椿白皮二兩焙乾取一兩末用 乳香二錢研

右除前膏外後五味為末入前膏内為丸梧桐大每服二十丸腸風煎木賊湯下痔疾荆芥湯下時瀉血米飲下空心日三服

琥珀散 治腸風一切血痢脾臟毒下血

琥珀屑研 鹿角霜 赤石豆 槐花 枳殼去穣麸炒

白芷各一兩

右除琥珀外並剉碎同炒令焦黑杵為散入琥珀研令勻每服二錢米飲調下空心食前各一服

防風餅　治腸瀉血

防風去叉　雞冠花　續斷　甘草炮　天麻　人參各半兩

右為末以油餅三個入藥三錢分作三個油餅早晨日午近晚以淡竹葉湯下

木香丸　治腸風不問年深日久

木香　白芷　乾蝎去土炒　阿魏各一兩　當歸炙半兩　漏蘆去蘆二兩

右各别擣以小童便一升煎阿魏三十沸後下木香煎三十沸後又下乾蝎當歸再煎如餳入白芷漏蘆末再和丸如桐子每服五丸至十丸空心温酒下

鈎腸丸　治腸風瀉血不止疼痛

附子一個炮去皮臍　石硫黄研　雞冠花　鯪鯉甲炒　皂莢

刺（炒各一兩） 蝟皮（二個燒灰）

右為末麵糊為丸梧桐子大每服二十丸槐花湯下日二服

臭椿皮散（出聖惠方） 治積年腸風瀉血穀食不消肌體黃瘦

臭椿樹白皮（二兩炙剉） 乾薑（炮剉） 甘草（炙剉各三分） 雞冠花 附子（炮去皮臍） 槐蛾（炙各二兩）

右為末每服二錢食前枳殼湯下

附子丸出聖惠方　治積年腸風瀉血面色萎黄

附子二箇炮去皮臍　食鹽　當歸剉炒　乾薑剉炮　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒　皁莢去黑皮塗醋炙各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服二十丸食前陳米飲下

生地黄散出聖惠方　治大便下血皆胃肺積熱流注大腸

生乾地黄　黄芩　赤芍藥　黄連去鬚　蒲黄　地骨皮各二兩

右㕮咀每服五錢水一大盞入竹茹一雞子大煎五分去滓頻温服

黄芩散出聖惠方 治大腸積熱下血不止日夜度數無恒

黄芩 黄柏 黄連去鬚 生乾地黄 地榆剉 犀角屑各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞入青茹半雞子大煎至六分去滓食前温服

治大便下血

草錦 蓮蓬殼 敗棕 白茅茜 新錦各等分

右為末溫米飲調下

五湯散 治瀉血不定

貫仲去土毛 槐花 地榆 黄連去鬚 甘草各等分

右為末每服一錢米飲調下

黑虎丸一名黑虎丹 治腸風累經大效

白礬研二兩 雞冠花乾者一兩 屋龍尾屋下烟煤是五錢 青橘皮洗去白焙 五靈脂焙各四兩

右為末分一半末用米醋二升慢火熬成膏候冷和一半為九梧桐子大每服三十九空心陳米飲下

車螯散一名如聖散　治腸風下血痔漏不止

車螯一合　白蒺刺四十九枚　硇砂　丹砂　乳香各一分三味同研

右以四味為末同車螯盛合子内以地龍泥固濟用炭六斤煆火盡為度取出研為細末空心温

酒調下一錢服

側栢散 治腸風瀉血等疾

側栢葉二斤九蒸九曬令乾 黒豆小者一升炒 甘草炙剉二兩 白朮

桂去粗皮各一兩

右為末每服二錢熱湯調下日三不拘時

大安散一名白礬散 治久患腸風瀉血

礬石灰研三兩 硫黄末 黄連去鬚為末 乳香研各一兩 蠟一錢

右為末熱湯調下每服三錢日二

桑耳散　治腸風下血風毒氣攻流注大腸疼痛

桑耳炒　枳殻去穰麸炒　木賊　當歸判炒　槐蛾炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

治積年腸風瀉血百藥無效

敗皮巾子燒灰　白礬燒灰各一兩　人指甲燒焦　麝香各一兩　乾薑三兩炮為末

右為末每服一錢食前温粥飲調下

止血散　治腸風下血或在便前或在便後在便前

者其血近乃腎肝血也在便後者其血遠乃心肺血也

皁角刺燒灰二兩　胡桃仁去皮　破故紙炒　槐花各一兩五錢

右為末每服二錢米飲送下溫酒亦可

槐花散方見痔漏門諸痔類治五痔　治腸風臟毒下血

治腸寒下血

核桃殼　蝟退皮　鞋底　赤雞冠花各等分

右共燒灰為末每服一錢溫酒調空心下

厚朴煎　治積年下血

厚朴五兩生薑五兩同搗爛于銀石器内炒令紫色　白朮一兩　大麥蘖　神麴各一兩同炒紫色

右為末水麵糊丸梧桐子大疾作時空心米飲下一百丸平時三五十丸昔王嗣康於纂照先處得此方韓縣尉名斐鄉父服之作效嗣康云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮滲入今用厚朴厚腸胃神麴麥蘖消酒食白朮導水血自不作也

治腸風有疕瘑瘡破者不治

馬蘭子一斤研破酒浸夏三日冬七日曬令乾　何首烏半斤　雄黃四兩　雌

黄四兩

右為末用浸馬蘭子酒打糊丸梧桐子大每服三十丸空心温酒下三服見效

治腸風臟毒

黄連一兩 黄芩一兩 地榆二兩 黄柏半斤

右為末煉蜜丸梧桐子大每服隨湯送下不計時忌一切毒物

治腸風久血

茅花　敗荷葉　敗棕各五錢燒灰存性　香附杵淨一兩少鹽和半炒焦半罨炒

右為末食前米飲調下

蘗皮丸　治臟毒便血疼痛嘔噦

黄連　黄蘗　芍藥　槐花炒各三兩

右為末滴水丸梧桐子大每服三十丸食前米飲下日進二服

麝香散　治腸風大小便出血淋澀疼痛婦人崩

蠶退紙燒灰存性 晚蠶沙揀去土炒 繭黃燒灰存性 白殭蠶炒去絲各等分

右為末每服二錢入麝香少許用飯飲調下糞前紅者食前服如糞後紅者食後服血崩淋澀等疾不拘時日三服熱淋止用蠶退紙一味燒灰存性研末飯飲下

治便紅

肥皂獨子者七箇去核 陳鹽海七箇入肥皂內水紙包裹文武火煨焦岀火氣研為

細末　香附炒黑末　陳艾燒灰各等分

右以米飯為丸空心飲湯送下

治便血

樗皮即大眼椿根上皮　水紅花即龍眼草上花　乾松　川百煎各等分

右為末空心温新汲水調下

酒蒸黄連丸出德生堂方　治酒食過度便血臟毒諸痔漏及瀉痢赤白臟腑疼痛胃腸痞悶氣不舒暢男子

婦人皆可服之解酒毒

黃連一斤好酒浸二日鍋内蒸透為度取出曬乾留酒和麪　乾薑半斤　枳殻半斤

木香四兩

右為末酒糊為丸梧桐子大每服五七十丸飯飲無時下

犀灰散出傳信適用方一名異功散　治五積腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血號内痔大腸不收號脫肛穀道四面有努肉如妳號鼠妳頭上有孔號漏此藥並

皆治之方見痔漏門痔漏類

抵聖散　治腸風下血

椿根白皮焙　蒺藜子炒去刺　枳殼去穰麸炒　防風去叉各一兩

右為末每服一錢白湯點服

四聖散　治腸風

貫仲　荆芥穗　白礬飛過　猪牙皁角醋炙各一兩

右同燒灰存性為末每服一錢温米飲調下空心食前日三服

槐實散　治腸風

槐實剉炒　防風　枳殼去穰麩炒透　黄耆剉炒各一兩

右為末每服一錢茶清調下

神應丸　治腸風經年不差瀉血疼痛

水牛角䚡燒灰　楮木頭　乾漆酒浸一宿炒令烟盡取出各二兩　槐耳一兩五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心熱酒下

枳實丸 治腸風

枳實麩炒 槐莢麩炒 皁莢猪牙者塗醋炙 大黄炒各一兩

右為末麵糊丸梧桐子大每服二十丸荆芥蠟茶下空心食前服

礬石丸出十便良方 治腸風下血久不止下部疼痛

白礬二兩飛過存一分性 皁莢二挺去皮塗醋炙 附子不去皮臍炮三度每度炮入水醮殺 乾薑炮各一兩

右為末用河水煮麵糊丸梧桐子大每服十丸鹽

湯空心食前服

木賊散 方見痔漏門腸痔類 治腸風下血多年不差

烏魚骨丸 治腸風

烏鰂魚骨 罐子內燒赤 肉蓯蓉 酒浸焙各半斤 桑根白皮 剉炒

蕪荑 各五錢

右為末醋煮乾飯丸梧桐子大空心米飲下五九

不嚼

防風散 治腸風

防風去叉炙　黄耆剉炙各二兩　甘草剉炙　人參各五錢

右為末每服二錢食前粟米飲調下

黄芩飲　治大腸風熱下血不止

黄芩去黑心　黄柏去粗皮　黄連　槲葉炙各一兩五錢

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分入地黄炙半合去滓温服不拘時

野狸骨散出聖惠方　治大腸風毒下血不止心神虚煩

野狸骨一兩酥炙　防風去叉五錢　益母草五錢　膩粉一錢

右為末每服五分食前温酒調下

治腸風下血不止腹痛日漸尫羸出聖惠方

栝樓一枚生者　槐花一兩　白麪一兩　皂角一挺不蛀者

右共擣作餅子燒令黑色為末每服一錢食前温粥調下

牛角䚡散出聖惠方　治積年腸風或發或歇不止

牛角䚡燒灰　槐耳　臭椿根炙　瓦松炙各二兩

右為末每服一錢食前温粥飲調下

治積年腸風下血 出聖惠方

蜜陀僧　白礬搗碎　槐子仁炒為末　皂角燒灰為末各一兩

右將蜜陀僧白礬入磁罐內燒令通赤候冷取出為末入槐子皂角灰相和研令勻粳米丸梧桐子大每服十五丸食前粥飲下

菰𧃍丸 出聖惠方 治積年腸風下血不止面色萎黃肌體枯悴

菰𧃍三枚割去蓋子　硫黃研　附子炮去皮臍　乾薑炮剉　猪牙皂

角去皮生擣碎各一兩

右共為細末入菰𤬪內以益子益定用竹籤插之以厚麪裹慢火燒麪黃焦為度候冷取出重研令極細以軟飯丸梧桐子大每服十五丸食前黃耆湯下

五槐丸出危氏方

五倍子　槐花陳者　百藥煎好者各等分

右焙乾為末酒糊為丸梧桐子大每服二十丸空心

米湯下日三服一方無百藥煎

治丈夫瀉血婦人血崩漬入大腸出血（出危氏方）

豆蔻 檳榔（各炒紫色） 罌粟殼（燒灰各等分）

右為末每服二錢米飲空心調服

聚金散（出醫方大成） 治腸中積熱或因毒大便下血腹中熱痛作渴脈來弦數之證

黃連（四兩一兩水浸曬乾一兩炒一兩灰火炮一兩生用） 黃芩 防風（去叉各一兩）

右為末酒糊丸梧桐子大每服五十丸米泔浸枳殼水下不拘時冬月宜入大黄一兩

香梅丸出醫方大成 治腸風臟毒下血

烏梅同核燒灰存性 香白芷不見火 百藥煎燒灰存性各等分

右為末米飲糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲送下

三神金烏散出仁存方 治大便下血

卷栢 側栢 棕櫚各等分

右燒灰存性為末每服三錢以酒調下空心服一

方研飯丸梧桐子大服一百米飲下

治腸風久而下膿血日數十度不止出百一選方一名枳實三百九

枳實半兩 槐花生用半兩 皁角一兩半生用半燒灰存性

右為末煉蜜為丸梧桐子大約可得三百九每服

三十九食前米飲下酒下亦可甚者一料即安

治腸風出百一選方

生乾地黄酒浸熟乾地黄酒浸 五味子各等分

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服五七十丸酒或湯下因心氣下血人可用妙香散酒調服梁路分患此疾吏十七藥不效服此一服而愈又方濃煎黄連湯下連翹丸或紅子丸

治酒毒便血不差經年者出百一選方一名槐花湯

橡斗子一兩　槐花一兩二味同炒黄色　白礬一分

右爲末每服二錢温酒調下

椿皮丸出經驗良方　治大便下血

椿樹根皮四面去粗皮焙乾　枳殻麩炒　蒼朮泔浸各一兩

右為末醋糊丸梧桐子大空心米飲下四十九

治腸風下血及肛門出良方出經驗

虎爪芀根　金罌子芀根　椿根各等分

右同烏梅甘草半水半酒空心服

治臓毒下血出經驗良方

側栢葉一兩白礬少許湯煮過焙乾　槐花二兩炒為末　椶數片陳者作燒灰存

性

右為末每服一匙温酒隨意調下

三栝蔞酒　治便紅

天栝蔞（即木饅頭收二三年者為佳）　地栝蔞（即白爛田螺殻）　水栝蔞（即蓮蓬殻久者佳）

右燒灰存性旨麻油調下

治腸風痔漏

荊芥三稜（用烏頭炒過切片子）　馬兜鈴藤　穀精草

右等分用水煎沸薰洗大效

治初得腸風及血痔 出本草

以槲栗葉微炙炒槐花減槲葉之半同為末米飲調服熱多者尤佳

治便血

蒲黄生用 荷葉頂 大蘿蔔皮各等分

右將荷葉大蘿蔔皮燒灰存性碾末和勻米湯調下空心服

黄連飲 治腸風瀉血如痢腹中疼痛面色萎黄

黄連(去鬚一兩) 乾薑(炮一分) 甘草(炙五錢)

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚擘煎六分去滓温服

黄耆丸 治腸風行步艱難

黄耆(炮剉) 枳殼(去瓤麩炒各一兩) 威靈仙(去鬚二兩)

右為末煉蜜丸菉豆大每服三十丸至五十丸用温水下並不損氣

烏梅丸 治瀉血

烏梅二十枚醋煮去核　白礬三兩飛過　訶梨勒三十枚炮去核

右將白礬訶梨勒為末與梅肉丸梧桐子大每服七九米飲下

神驗膏　治腸風下血冷不入食

背陰臭椿皮根上不見日者取刹嫩皮一斤　黑豆半升　槐花二兩

右以水五升于銀石器内慢火熬令豆熟為度續入蜜二兩再煎候蜜熟傾出盛淨磁内夜露兩宿每日食後臨卧各一服每服約半盞許用重湯温熱得所

旋旋服食

大效丸　治腸風瀉血

大薊根七截各長一寸又名荆芥　白礬一兩細研　麝香當門子豆許大七粒研

右用不霑土大栝蔞一箇割下葢子不去穰入大薊根白礬當門子在内用箆子左攪七遭安葢在上以鹽一合和土固膶陰乾用炭火煆透赤便住候冷去泥細研為末取一半為散一半以糯米粥為

丸梧桐子大每日空心將大薊苗煎湯調下五分至日午臨卧又煎大薊苗酒下十丸服三兩日便須服過三五箇栝蔞永去病根

獨活丸　治腸瀉血不止

獨活去蘆研為末五錢　黄蠟五兩銀器中鎔成汁　生薑半斤取自然汁

右以薑汁入熬以汁盡為度次入獨活末令勻衆手急丸梧桐子大每服四十丸以濃陳米飲送下空心臨卧服

榮順散　治腸風下血痛不可忍

枳殼去穰麸炒一兩　荆芥穗一兩　槐蛾半兩炒黄

右為末每服二錢温米飲調下不拘時未效再服

龍肝散　治腸風瀉血

伏龍肝　般丹　牡蠣各五錢

右為末每服二錢陳米飲調下不拘時

治腸風痔漏大便常血出肘後方

苦桃皮　萹竹　苦參

右煮汁漬之大妙燒稻藁灰汁漬之亦良

治腸風下血疼痛不止出聖惠方

道人頭一兩 荆芥穗一兩 皁角三寸去黑皮塗醋炙去子

右為末每服一錢食前粥飲調下

内補散出聖惠方 治大腸風毒下血

黄耆剉 枳殻去穣麩炒 側栢葉炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風毒下血不止出聖惠方

枸杞子 槐子炒 桑木耳炙各二兩

右為末每服二錢食前黄耆粥飲調下

又方出聖惠方

枳殼去穰麩炒 何首烏 乾薑炮剉各一兩

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

釜下墨 棕櫚皮 訶梨勒皮煨各一兩

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

牛角䚡　棕櫚皮　乾薑各一兩

右都為末研匀每服二錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

牛角䚡一對雄黄一塊如棊子大麝香一分細研

右每一隻牛角䚡安雄黄一塊在内以稠泥封閉下面用桑柴火燒熟研為散入麝香和匀又以栝蔞一對亦用桑柴火燒令熟研為散每服栝蔞末二錢

牛角䚡末一錢相和令勻食前米飲調下

治腸風下血發歇不止出聖惠方

荊芥穗　薄荷　枳殼各一兩麸炒去穰

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

皁莢不蛀者三兩　栝蔞一枚　白礬二兩

右件藥入瓶內以鹽泥固濟候乾以炭火燒令通赤候冷細研令勻每服二錢食前粥飲調下

神效方出聖惠方　治腸風積年瀉血不止


黄丹一兩　白礬一兩　栝蔞一枚去頭入二味在内

右以物蓋栝蔞頭鹽泥固擠安磚上大火燒令通赤放冷取出搗細為末每服一錢食前煖刺薊汁調下

治腸風積年下血不止出聖惠方

野狸頭一枚　桑根西枝一握剉　附子一枚

右件藥入瓶内鹽泥封固候乾炭火燒令通赤候



冷取出為末每服二錢食前粥飲調下

又方出聖惠方

皁莢七挺不蛀者去黑皮塗醋炙去子細研末　寒食蒸餅子　烏龍尾各二兩

右共為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲調下

又方出聖惠方

槐耳半斤切　皁莢十挺剥去皮子　硇砂一兩細研

右以米醋三升煎取一升去滓再入鐺中以大火養成膏入硇砂和匀丸梧桐子大每服十丸空心及晚食前温粥飲下

治積年腸風下血疼痛出聖惠方

竈突墨二兩 荆芥一兩 木香一兩

右為末水浸蒸餅為丸梧桐子大每服三十丸食前槐子湯下

治積年腸風下血面色萎黄下部腫痛出聖惠方

綠礬（二兩燒赤）　釜底墨　烏賊魚骨（炙焦各一兩）

右為末粟米飯為丸梧桐子大每服三十丸食前煎赤糙米湯下

又方（出聖惠方）

皁角（去黑皮塗酥炙去子）　蕓薹子（炒各一兩）　枳殼（二兩麩炒去穰）

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十丸食前枳殼湯下

治大便下血不止（出聖惠方）

生乾地黃二兩　阿膠碎炒　白蘞五兩

右㕮咀每服三錢水一盞入竹葉二七片煎至六分去滓食前溫服

治腸風出本事方

五倍子　白礬各五錢

右為末順流水為丸梧桐子大每服七丸空心飯飲下

治腸風瀉血出本事方

牽牛_{五兩}牙皂_{三兩不蛀者}

右水浸三日後除皁角以酒一升煮令乾焙為末煉蜜丸梧桐子大每服七丸空心温酒下空心日午夜卧各一服或轉下黄物不妨病後可常服每日五丸

飯飲送下

治腸風及熱毒下血或因食熱物發動_{出本事方}

金星草　陳乾薑_{各三兩}

右為末每服一錢新汲水調下

當歸赤小豆散出千金方　治先血而後便謂之近血及治

大腸秘

赤小豆五兩浸出芽曬乾一法熬令拆　當歸一兩

右為末漿水服方寸匕日三四服

治臟毒下血出危氏方一名卷柏散

地栢生土石傍高四五寸根黄如絲上細有黄點正似栢枝曝乾用一作卷栢　黄耆各等分為細末

右末每服二錢水調下

治便血及臟毒下血經年瘦者出仁存方

槐花　五倍子各炒焦等分

右為末麵糊為丸梧桐子大每服五六十丸米飲吞下食前

荊芥散出經驗良方　治腸風下血

荊芥穗　縮砂仁各等分

右為末每服三錢用糯米飲調下不拘時日進三服一方食前服

地榆湯出百一選方

地榆洗淨焙乾剉 卷栢不去根洗淨各等分

右㕮咀水一椀沙瓶内煮數十沸通口服不拘時每用一兩

茱萸丸出直指方 治腸風下血二三十年者

鷹爪黄連 吴茱萸各等分

右新瓦上同炒候茱萸香熟黑色為度去茱萸不用將黄連為末空心温酒下二三錢米飲下亦得

又方黄連茱萸陳米糊丸梧桐子大每服五十丸米飲下日二服更以胃風湯煎如法吞下一方名萹血丸用木香一兩濕紙裹煨香以酒糊丸切忌白酒雞肉鮓醬

普濟方卷三十七